

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

**KAMPARSPIRTS un SKUDRSPIRTS RFF uz ādas lietojams šķīdums**

*Spiritus Camphoratus 10%, Spiritus formicicus 1.25%*

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF uz ādas lietojamu šķīdumu rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 5 - 7 dienām, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Kamparspirts un Skudrspirts RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Kamparspirta un Skudrspirta RFF lietošanas
3. Kā lietot Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF
6. Sīkāka informācija

**1. KAS IR KAMPARSPIRTS UN SKUDRSPIRTS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

Kamparspirts un Skudrspirts RFF ir uz ādas lietojams šķīdums.

Tas pieder pie kairinošiem līdzekļiem ar tā saukto „atvelkošo” iedarbību: ja zāles ierīvē, ādas kairinājums reflektori rada vietēju asinsvadu paplašināšanos, radot siltuma un komforta sajūtu sāpošajās locītavās un nervos.

Zāles lieto ierīvēšanai reimatoīdā artrīta un neiralģijas gadījumā.

**2. PIRMS KAMPARSPIRTA UN SKUDRSPIRTA RFF LIETOŠANAS**

**Nelietojiet Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF šādos gadījumos**

Ja Jums ir:

- paaugstināta jutība pret kādu no zāļu sastāvdaļām un formalīnu,
- vaļējas brūces, iekaisusi āda, apdegumi,
- vienlaicīgi nedrīkst apziest plašus ādas laukumus,
- nelietot bērniem un nieru slimniekiem ar urīna izvades traucējumiem,
- nelietot grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā.

**Īpaša piesardzība, lietojot Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF, nepieciešama šādos gadījumos**

Lietojot ilgstoši, var iekaiest āda.

Nedrīkst pieļaut iekļūšanu acīs, mutēs, dobumā un uz citām gļotādām. Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Nav ieteicams apstrādāt lielus ķermeņa ādas laukumus.

### **Citu zāļu lietošana**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Kamparspirta un Skudrspirta RFF mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

### **Kamparspirta un Skudrspirta RFF lietošana kopā ar uzturu**

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

### **Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF nedrīkst lietot.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Kamparspirts un Skudrspirts RFF neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

## **3. KĀ LIETOT KAMPARSPIRTU UN SKUDRSPIRTU RFF**

2-5 ml šķīduma (atkarībā no locītavu vai sāpošo vietu lieluma) ierīvē ādā virs sāpošajām ķermeņa vietām 1-2 reizes dienā.

Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF nedrīkst lietot bērniem.

### **Ja esat lietojis Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF vairāk nekā noteikts**

Pārdozēšana, lietojot Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF ārīgi, nav novērota.

Ja konstatēts ādas kairinājums, nekavējoties zāles no ādas jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām (piemēram, acīs), jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Saindēšanās iespējama, ja zāles iedzer. Ja Jūs vai Jūsu bērns nejauši zāles ir iedzēris, nekavējoties sazinieties ar tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu vai savu ārstu.

### **Ja esat aizmirsis lietot Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF**

Nākošajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

## **4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Tāpat kā citas zāles, Kamparspirts un Skudrspirts RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējams ādas kairinājums (apsārtums, iekaisums).

Reti novērota kontaktekezēma.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

## **5. KĀ UZGLABĀT KAMPARSPIRTU UN SKUDRSPIRTU RFF**

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Kamparspirtu un Skudrspirtu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

### **Ko Kamparspirts un Skudrspirts RFF satur**

- Aktīvās vielas: 1 ml šķīduma satur:
    - 445 mg kamparspirta 10% (*Spiritus Camphoratus* 10%) un
    - 445 mg skudrspirta (*Spiritus formicicus* 1.25%).
- Citas sastāvdaļas: etilspirts 96%, attīrīts ūdens.

### **Kamparspirta un skudrspirta RFF ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu kampara smaržu.  
Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.  
Pudelītei uzlīmēta etiķete. Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"  
Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV-1005  
Telefons 67355550, 67355551  
Fakss 67355551  
e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 10. jūnijā