

## Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

### Kordiamīns 250 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

*Nicethamidum*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pēc zāļu lietošanas pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir zāles Kordiamīns un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Kordiamīns lietošanas
3. Kā lietot zāles Kordiamīns
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt zāles Kordiamīns
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

#### **1. Kas ir zāles Kordiamīns un kādam nolūkam tās lieto**

Zāles Kordiamīns lieto kā centrālās nervu sistēmas (CNS) stimulējošu līdzekli. Indicēts papildus terapijai elpošanas un asinsrites stimulācijai.

#### **2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Kordiamīns lietošanas**

**Nelietojiet zāles Kordiamīns šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu;
- ja Jums ir porfīrija (reta iedzimta vielmaiņas slimība);
- ja Jums ir smagas sirds slimības (hipertensija, stenokardija);
- ja Jums ir izteikti sirds ritma traucējumi;
- ja Jums ir plaušu obstruktīva slimība;
- ja Jums ir smadzeņu tūska;
- ja Jums ir insults;
- ja Jums ir krampju lēkmes (epilepsija);
- ja Jūs saindējaties ar indēm, kas izraisa krampjus;
- ja Jūs pārdozējat narkotiskos pretsāpju līdzekļus (iespējami izteikti krampji);
- bērniem līdz 12 gadu vecumam;
- ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

**Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Šīs zāles nav paredzētas ilgstošai lietošanai.

Pirms zāļu Kordiamīns lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.  
Zāles Kordiamīns ir stimulējošs līdzeklis, kurš iekļauts sportā aizliegto vielu sarakstā.

### **Bērni**

Dati par zāļu Kordiamīns lietošanas drošumu bērniem nav pieejami.

### **Citas zāles un Kordiamīns 250 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Aminazīns un rezerpīns: veicina krampju darbību.

Meprobamāta pārdozēšanas gadījumā: elpošanas nomākums.

Ftivazīds: sekmē nepanesamības veidošanos.

CNS nomācošie līdzekļi: depresējošā ietekme uz nervu sistēmu samazinās.

Fenitoīna pārdozēšanas gadījumā: pasliktinās slimnieka stāvoklis.

Aminazīns un citi fenotiazīna atvasinājumi: stimulējošā darbība samazinās.

Monoamīnoksidāzes inhibitori: pastiprinās asinsspiedienu paaugstinošā darbība.

Narkozes līdzekļi: samazinās efektivitāti.

Skābes un bāziskie savienojumi: inaktīvi.

Miega līdzekļi: antagonisms.

Nomierinošie līdzekļi: antagonisms.

### **Kordiamīns 250 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīduma lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu**

Uzturs neietekmē lietošanas efektivitāti.

Nav pieejami dati par alkohola ietekmi uz zāļu Kordiamīns lietošanas efektivitāti un drošumu.

### **Grūtniecība un barošana ar krūti**

Nav pierādīts zāļu Kordiamīns lietošanas drošums grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā, tādēļ grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, to nedrīkst lietot.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Nav datu par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

## **3. Kā lietot zāles Kordiamīns**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles Kordiamīns lieto iekšķīgi 2-3 reizes dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

*Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki cilvēki*

Reizes deva ir 20-30 pilieni. Maksimālā reizes deva - 60 pilieni (2 ml), maksimālā dienas deva - 180 pilieni (6 ml)

### **Lietošana bērniem un pusaudžiem**

Zāles Kordiamīns nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

### **Ja esat lietojis zāles Kordiamīns vairāk nekā noteikts**

Nav datu par zāļu Kordiamīns pārdozēšanas gadījumiem. Pārdozēšanas gadījumi cilvēkiem līdz šim nav aprakstīti. Tomēr, ja šīs zāles esat lietojis vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu.

### **Ja esat aizmirsis lietot zāles Kordiamīns**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

#### **Ja Jūs pārtraucat lietot zāles Kordiamīns**

Pārtraucot šo zāļu lietošanu, nevēlami efekti nav novēroti. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

#### **4. Iespējamās blakusparādības**

Tāpat kā visas zāles, Kordiamīns 250 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti zālēm Kordiamīns ir laba panesamība.

*Reti* (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

- alerģiskas reakcijas;
- sejas apsārtums, nieze.

*Nav zināmi* (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

- nemiers;
- muskuļu raustīšanās;
- sirdsklauves, paaugstināts asinsspiediens.

#### Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv).

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

#### **5. Kā uzglabāt zāles Kordiamīns**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

#### **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

##### **Ko zāles Kordiamīns satur**

Aktīvā viela: niketamīds.

1 ml šķīduma satur 250 mg niketamīda.

Cita sastāvdaļa: attīrīts ūdens.

**Zāļu Kordiamīns ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, bezkrāsains vai dzeltenīgas nokrāsas šķidrums ar specifisku smaržu.

Pa 25 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu.

Pudelei uzlīmēta etiķete.

Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

E-pasts: rff@rff.lv

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 11/2016**