

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

LIKOPODIJS RFF uz ādas lietojams pulveris

Lycopodium

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Likopodijs RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Likopodija RFF lietošanas
3. Kā lietot Likopodiju RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Likopodiju RFF
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR LIKOPODIJS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TOS LIETO

Likopodijs RFF ir ārstniecības augu droga (staipekņu sporas), ko lieto arīgi kā adsorbcijas līdzekli, galvenokārt bērniem, izsūtumu un izsvīdumu gadījumos. Likopodijam piemīt mitrumu adsorbējošas un pretiekaisuma īpašības.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS LIKOPODIJA RFF LIETOŠANAS

Nelietojiet Likopodiju RFF, ja Jums ir alerģija pret likopodiju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Likopodija RFF lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Nav ieteicams kaisīt Likopodiju RFF uz vaļējām brūcēm, jo likopodijs var traucēt brūču dzīšanu.

Izvairieties no Likopodija RFF ieelpošanas, jo iespējams elpceļu kairinājums ar sekojošu alerģisku reakciju (nieze, šķavas, izdalījumi no deguna, lēkmjveida elpas trūkums) un/vai iekaisumu. Šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc 1 nedēļu ilgas zāļu lietošanas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Likopodijs neaizstāj pretiekaisuma vai antibakteriālu terapiju un zīdaiņiem stāvokļa dinamikai ir noteicošā loma.

Citas zāles un Likopodijs RFF

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Likopodija RFF mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārīgi lietojot, negatīva ietekme nav zināma. Grūtniecības periodā zāles var lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Likopodijs RFF neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. KĀ LIETOT LIKOPODIJU RFF

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Likopodiju lieto arīgi. Bojāto ādas vietu (zīdaiņiem parasti cirkšņus) iepūderē ar likopodiju plānā kārtiņā 3-5 reizes dienā vai bērna autiņu apmaiņas reizē.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Likopodijs RFF neaizstāj pretiekaisuma vai antibakteriālu terapiju un zīdaiņiem stāvokļa dinamikai ir noteicošā loma.

Ja esat lietojis Likopodiju RFF vairāk nekā noteikts

Ārīgi lietojot, pārdozēšana nav iespējama.

Ja esat aizmirsis lietot Likopodiju RFF

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, Likopodijs RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Likopodiju parasti panes labi, vienīgi, uzkaisot uz vaļējām brūcēm, tas var traucēt dzišanu.

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Nav novērotas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT LIKOPODIJU RFF

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc "Derīgs līdz:".

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Likopodijis RFF satur

Aktīvā viela ir likopodijis.

Citu sastāvdaļu nav.

Likopodija RFF ārējais izskats un iepakojums

Ļoti smalks, slīdīgs, viendabīgs, bāli dzeltens staipekņu sporu pulveris bez smaržas un garšas.

Staipekņu sporas, fasētas pa 5 g tumša stikla trauciņā, kas kopā ar lietošanas instrukciju iepakots marķētā kartona kastītē.

A/S „Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Tel.: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

E-pasts: rff@rff.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 10/2016