

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

SKUDRSPIRTS RFF uz ādas lietojams šķīdums

Acidum formicicum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Skudrspirts RFF uz ādas lietojams šķīdums rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 5 - 7 dienām, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Skudrspirts RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Skudrspirta RFF lietošanas
3. Kā lietot Skudrspirtu RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Skudrspirtu RFF
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR SKUDRSPIRTS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Skudrspirts RFF ir uz ādas lietojams šķīdums. To lieto muskuļu, locītavu un nervu sāpju gadījumos.

Skudrspirts RFF pieder pie kairinošiem līdzekļiem ar tā saukto „atvelkošo” iedarbību: ja zāles ierīvē, ādas kairinājums reflektori paplašināšana vietējos asinsvadus, radot siltuma un komforta sajūtu sāpīgajās ķermeņa daļās.

2. PIRMS SKUDRSPIRTA RFF LIETOŠANAS

Nelietojiet Skudrspirtu RFF šādos gadījumos

Ja Jums ir:

- alerģija pret kādu no zāļu sastāvdaļām, ja ir paaugstināta jutība pret skudrskābi, formalīnu vai spirtu,
- vaļējas brūces, iekaisusi āda, apdegumi,
- vienlaicīgi nedrīkst apziest plašus ādas laukumus,
- nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam,
- nelietot grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā.

Īpaša piesardzība, lietojot Skudrspirtu RFF, nepieciešama šādos gadījumos

Lietojojot ilgstoši, var iekaist āda.

Nav ieteicams apstrādāt lielus ķermeņa ādas laukumus.

Nedrīkst pieļaut iekļūšanu acīs, mutēs, dobumā un uz citām gļotādām. Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Uzmanīgi lietot nieru slimniekiem ar traucētu šķidrums izvadi no organisma.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav zināma.

Skudrspirta RFF lietošana kopā ar uzturu

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, Skudrspirtu RFF nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārīga Skudrspirta RFF lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Svarīga informācija par kādu no Skudrspirta RFF sastāvdaļām

Zāles satur 70% etilspirtu.

3. KĀ LIETOT SKUDRSPIRTU RFF

Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Skudrspirts RFF ir uz ādas lietojams šķīdums.

2-3 ml šķīduma (atkarībā no locītavu vai sāpošo vietu lieluma) ierīvē ādā virs sāpošajām ķermeņa vietām 1-2 reizes dienā.

Skudrspirtu RFF nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Skudrspirtu RFF vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana, lietojot Skudrspirtu RFF ārīgi, nav novērota.

Ja konstatēts ādas kairinājums, nekavējoties zāles no ādas jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām (piemēram, acīs), jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Skudrspirtu RFF

Nākošajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Skudrspirts RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējams ādas kairinājums (apsārtums). Reti novērots dermatīts.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT SKUDRSPIRTU RFF

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Skudrspirtu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes vai kastītes.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Skudrspirts RFF satur

- Aktīvā viela ir skudrskābe. 1 ml šķīduma satur 12,47 mg 85% skudrskābes (*Acidum formicicum 85%*).
- Citas sastāvdaļas: 96 % etilspirts, attīrīts ūdens.

Skudrspirta RFF ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu.

Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV-1005, Latvija

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 16. martā